Anhang 5: Artbezogene Erfassungszeiträume für die Kartierung der planungsrelevanten Tierarten

Anhang 5b: Erfassungstermine - Säugetiere

Artname deutsch	Artname wissenschaftlich	Januar			Februar			März			April			Mai			Juni			Juli			August			September			Oktober			November			Dezember		
		A	M	E	A	M	E	A	M	E	A	M	E	A	M	E	A	M	E	A	M	E	A	M	E	A	M	E	A	M	E	A	M	E	A	M	E
Bechsteinfledermaus	Myotis bechsteinii				W									A		A	N;Q	A	A		A	N; Q		A		A									W		
Braunes Langohr	Plecotus auritus				W									A		A	N;Q	A	A		A	N; Q		A		A									W		
Breitflügelfledermaus	Eptesicus serotinus				W									A		A	N;Q	A	A		A	N; Q		A		A									W		
Fransenfledermaus	Myotis nattereri				W									A		A	N;Q	A	A		A	N; Q		A		A									W		
Graues Langohr	Plecotus austriacus				W									A		A	N;Q	A	A		A	N; Q		A		A									W		
Große Bartfledermaus	Myotis brandtii				W									A		A	N;Q	A	A		A	N; Q		A		A									W		
Großer Abendsegler	Nyctalus noctula	W		W		W								A		A	N;Q	A	A		A	N; Q		A		A							W			W	
Großes Mausohr	Myotis myotis				W									A		A	N;Q	A	A		A	N; Q		A		A									W		
Kleine Bartfledermaus	Myotis mystacinus				W									A		A	N;Q	A	A		A	N; Q		A		A									W		
Kleinabendsegler	Nyctalus leisleri	W		W		W								A		A	N;Q	A	A		A	N; Q		A		A							W			W	
Mopsfledermaus	Barbastella barbastellus				W									A		A	N;Q	A	A		A	N; Q		A		A									W		
Mückenfledermaus	Pipistrellus pygmaeus				W									A		A	N;Q	A	A		A	N; Q		A		A									W		
Nordfledermaus	Eptesicus nilssonii				W									A		A	N;Q	A	A		A	N; Q		A		A									W		
Rauhhautfledermaus*	Pipistrellus nathusii*																									A											
Teichfledermaus	Myotis dasycneme				W									A		A	N;Q	A	A		A	N; Q		A		A									W		
Wasserfledermaus	Myotis daubentonii				W									A		A	N;Q	A	A		A	N; Q		A		A									W		
Wimperfledermaus	Myotis emarginatus				W									A		A	N;Q	A	A		A	N; Q		A		A									W		
Zweifarbfledermaus*	Vespertilio murinus*																																		W		
Zwergfledermaus	Pipistrellus pipistrellus				W									A		A	N;Q	A	A		A	N; Q		A		A									W		
Sonstige Säuger																																					
Europäischer Biber	Castor fiber						N					B				B			B						B												
Haselmaus	Muscardinus avellanarius											K			H		K			K	H			K		H		K			N		(N)				
Feldhamster	Cricetus cricetus												B				L							B	L												
Wildkatze	Felis silvestris	L	L	L	L	L	L	L																													

Wichtiger Hinweis: **Aus Gründen des Artenschutzes dürfen Netzfänge von Fledermäusen nicht unmittelbar vor, während und nach der Geburtsphase zum Einsatz kommen. Besonders kritisch sind diesbezüglich die Hochträchtigkeitsphase sowie die frühe Laktationsphase (eine Woche vor und nach der Geburt).**

Legende

Fledermäuse	**Kürzel**	**Methode**	**Haupterfassungs-zeitraum**	**erweiterter Erfassungs-zeitraum**
Sommerlebensraum (Jagdgebiete, Flugrouten, Quartiere), Populationsgröße, Aktionsraumgröße	A	Akustische Erfassung (stationär, Detektor)		
	N	Netzfänge		
	Q	Quartiersuche; Ausflugszählungen, Telemetrie etc.		
Winterlebensraum	W	Winterkontrollen (visuell)		

* Fernwanderer, in NRW verbreitet als Durchzügler anzutreffen (keine relevante Überwinterung). Erfassung während der Zug- und Paarungszeit; Erfassung von Sommervorkommen im Einzelfall.

** i.d.R. keine artspezifische Erfassung; Fernwanderer, in NRW sporadisch zu allen Jahreszeiten als Durchzügler in sehr geringer Zahl anzutreffen; im Einzelfall Erfassung der Balzaktivität im Nov./Dez.

SÄUGER

Art	**Kürzel**	**Methode**	**Haupterfassungs-zeitraum**	**erweiterter Erfassungs-zeitraum**
Biber	N	Bibernachweise		
	B	Bestandserfassung; Reviernachweis		
Haselmaus	N	Nestersuche		
	H	Hafthaarröhrensuche		
	K	Nistkastenkontrolle		
Wildkatze	L	Lockstockkontrolle		
Feldhamster	B	Suche nach Hamsterbauten		
	L	Lebendfang zur Berechnung Populationsgröße		